



あなたが風しんの感染を拡大させて しまう可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために抵抗力(抗体)を確認・獲得しましょう

成人がかかると小児に比べて症状が重くなることもあります。

また、妊娠初期の人に風しんを感染させてしまうと、胎児に感染して先天性風しん症候群(難聴、心疾患、白内障及び網膜症等)をもって生まれてくる可能性が高くなります。感染を拡大させないために抗体検査を受け、風しんに対する抵抗力(抗体)がなかった場合は、予防接種を受けましょう。

小牧市 風しん抗体検査・予防接種のお知らせ

令和4(2022)年3月31日までの期間限定で
風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。

公的なワクチン接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)になっています。

そのため、令和4(2022)年3月31日までの期間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性にクーポン券を送付しています。

同封のクーポン券を利用して、健康診断の機会など、医療機関で抗体検査を受けていただきます。
その結果、十分な量の抗体がない方は、予防接種を受けていただきます。

～抗体検査・予防接種までの流れ～

① 対象者にクーポン券が届きます。



② クーポン券と本人確認書類を持参し、
医療機関で抗体検査を受けます。



③ 抗体検査の結果を聞きます。

抗体なし

・風しんにかかるリスクがあります。

抗体あり

・定期予防接種の対象にはなりません。



④ 予防接種を受けましょう
(クーポン券と本人確認書類、抗体検査の結果通知が必要です。)

☆抗体検査・予防接種とも本事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。

☆抗体検査・予防接種を受けられる小牧市内の医療機関のリストは、4ページに掲載しています。

小牧市以外の受託医療機関でも受けることができます。

小牧市外の医療機関のリストは厚生労働省の、ホームページに掲載されていますので、確認してからお出かけください。



◎ 風しんとは.....

風しんウイルスによる感染症で、三日はしかとも呼ばれます。潜伏期は2～3週間で、発熱と発疹を主な症状とし、風しんの抗体がない方がかかった場合5～7人にうつすと言われ、強い感染力があります。

また、妊娠中の女性が風しんに感染すると、目や耳などに障害（先天性風しん症候群）を持った赤ちゃんが生まれることがあります。大人になってかかると重症になりますので、自分がかからない予防と妊娠中の女性にうつさないようにするためにもワクチン接種が必要です。

◎ 予防接種の効果は.....

風しんの抗体検査を受けた結果、抗体が十分でないと分かった方は、定期予防接種の対象となります。

接種するワクチンは麻しん風しん混合（MR）ワクチンです。

接種を受けた方の約95%以上に麻しん・風しんとも抗体を獲得しています。

ワクチンによる免疫は長期にわたり持続すると考えられています。

◎ 副反応は.....

生ワクチンのため、接種後ウイルスが体内で増え、二週間前後に発熱、発疹等がみられる場合があります。通常は1～2日で消失します。他の副反応としては、注射部位の発赤・腫脹・硬結などの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、倦怠感があります。重大な副反応としてはごくまれに、ショック、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんが起こる場合があります。

予防接種を受けた人から、周りの人に感染することはありません。

◎ 予防接種の注意事項.....

《予防接種を受ける前に》

1 予防接種を受けることができない方

- (1) 明らかに発熱している方（通常37.5℃以上）
- (2) 重篤な急性疾患にかかっている方
- (3) 麻しん風しん混合（MR）ワクチンの成分によってアナフィラキシー様反応を呈したことがある方
- (4) 風しん抗体検査を受けた結果、基準値を超える抗体価が認められた方
- (5) その他、医師が予防接種をすることが不適当な状態と判断した方

2 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない方

- (1) 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などの基礎疾患がある方
- (2) 過去の予防接種で2日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
- (3) 過去にけいれん（ひきつけ）の既往がある方
- (4) 過去に免疫不全の診断がなされている方
- (5) このワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある方

《予防接種を受けた後の注意点》

- (1) 予防接種を受けた後、急な副反応が30分以内に起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。
- (2) 接種後、接種した部位の痛みや熱をもってひどく腫れたり、体調変化が現れた場合は、速やかに接種した医師（医療機関）の診察をうけてください。
- (3) 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすことはやめましょう。
- (4) 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動は避けましょう。

よくあるご質問

Q1

クーポン券が届いたのですが、使用する前に別の市区町村に引越しをしました。転出先の市区町村でも、このクーポン券を使うことができますか？

A

クーポン券を使用する時点で住民票のある市区町村が発行したクーポン券のみ有効です。そのため、お手持ちのクーポン券は使用できません。転出先の発行するクーポン券に交換をしてもらってからご使用ください。

Q2

クーポン券を紛失してしまいましたが、抗体検査を受けることはできますか？
また、医療機関に行くときにクーポン券を忘れてしまいました。抗体検査を受けることは可能ですか？

A

クーポン券が無ければ、無料で抗体検査を受けることはできません。また、紛失した場合は再発行しますので保健センターにご連絡ください。

Q3

本人確認書類はなぜ必要なのですか？本人確認書類として、何を持っていけばいいですか？

A

本事業の対象者であるかを確認するためです。免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどをお持ちください。

Q4

特定健診の受診時や職場での健診の受診時に一緒に抗体検査を受けることができますか？

A

できます。ただし事前に対応可能な医療機関であるかをホームページなどで確認した上で、受診してください。その際には必ずクーポン券を持参してください。

Q5

過去に風しんの予防接種を受けたことがありますが、受けなくてもいいですか？

A

予防接種を受けてもその後、抗体検査をしてみないと予防接種が有効であったかどうかはわかりません。この機会にクーポン券を使用して抗体検査を受けてください。抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された場合は、予防接種を必ず受けてください。



詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください

風しんの追加的対策

検索

【お問合せ先】小牧市保健センター
TEL 0568-75-6471

無料でできるこの機会に是非、風しんの抵抗力(抗体)を獲得しましょう